

STAMMOPUR 24

Intensiv rengöring och desinfektion

för ultraljud • konzentrat

VAH-certifierat • **MD** C€ 0483

EXAM-bedömning • N-69946

Intensivrengöring och kemisk desinfektion av medicinska instrument och tillbehör

Koncentrat för manuell, desinficerande, icke-fixerande intensivrengöring och för kemisk desinfektion, både i ultraljudsbad och vid doppning av

allmänna, kirurgiska, invasiva och icke-invasiva medicinska instrument och tillbehör samt av laboratorieapparater, laboratorieinstrument,

på sterilcentralen, kliniken och på läkarmottagningen.

För kritiska och semikritiska medicintekniska produkter krävs ytterligare beredningssteg. Använd inte för slutlig desinficering.

Information om icke-medicinsk användning

Rapporterat som biocid enligt biociddirektivet (förordning (EU) nr 528/2012).

Även avsett för behandling av personlig skyddsutrustning (PSU), i synnerhet andningsmasker, skyddsglasögon och visir samt i icke-medicinska laboratorier för laboratorieapparater och laboratorieinstrument.

Tolereras av många material, lämplig för delar av metall, lättmetall, titan, glas, porslin, keramik, gummi och plast. Om du är osäker skall du testa dessa i förväg.

Användning i ett ultraljudsbad (dosering • exponeringstid)

1 % • 15 min eller 2 % • 5 min:

baktericid¹, levurocid², begränsad virucid³ inkl. H5N1 och SARS-CoV-2

Användning utan ultraljud (dosering • exponeringstid)

1 % • 60 min:

baktericid¹, levurocid²

2 % • 30 min eller 3 % • 15 min:

baktericid¹, levurocid², begränsad virucid³ inkl. H5N1 och SARS-CoV-2

¹EN 13727, EN 14561, DGHM, hög belastning; ²EN 13624, EN 14562, DGHM, hög belastning; ³EN 14476, hög belastning

När produkten används skall den spädas ut med vatten av minst dricksvattenkvalitet och utan ytterligare tillsatser. Se till att produkten väts fullständigt. Skölj delarna grundligt med vatten efter behandlingen och torka dem. Byt brukslösning omedelbart när föroreningar blir synliga, dock senast efter 3 dagar. Undvik att låta temperaturen överstiga 45 °C (risk för proteinfixering). Ej förenlig med aldehydpreparat.

Beakta produktinformationen på www.dr-stamm.de.

Endast för yrkesmässig användning.

Milt alkaliskt (pH 9,4 vid 1 % i avjoniserat vatten), biologiskt nedbrytbart.

100 g innehåller:

9,9 g bis(3-aminopropyl)dodecylamin, 8,4 g didecylmetylpolyoxietylammmoniumpropionat, < 30 % butan-1,4-diol, 5–15 % butyldiglykol, 5–15 % icke-joniska tensider, < 5 % piperazin, komplexbildare, pH-värdesregulatorer.

Faroangivelser

- H302 Skadligt vid förtäring.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H361fd Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
+P338 kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Fara



UFI-Code: E800-POU8-F00Q-TAGT

Allvarliga incidenter med produkten ska rapporteras till DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik och den behöriga myndigheten.

Basis-UDI-DI: ++G014ST2403RG

Denna bruksanvisning är en översättning. Den bindande utgåvan är den tyska versionen.
S 3460/13e – 2023/02sv



DR.H.STAMM GmbH Chemische Fabrik
Heinrichstraße 3-4 • 12207 Berlin (Germany)
Tel.: +49 30768 80 280 • Fax: +49 30 773 46 99
www.dr-stamm.de • info@dr-stamm.de

EG-säkerhetsdatablad och produktinformation som kan laddas ner som PDF-filer på www.dr-stamm.de